

الكشف عن فاشيات الكوليرا ورصدها

الدور المحوري للسلطات الصحية



الدور الرئيسي للسلطات الصحية (المحلية) هو ضمان إنتاج معلومات موثوقة و في الوقت المناسب بواسطة نظام الترصد من أجل الاستجابة للكوليرا



• هل يُبلِّغ عن حالات الكوليرا وتخضع للاختبارات كما ينبغي؟

تُطبَّق مجموعة مختلفة من تعريف الحالات، والجداول الزمنية للإبلاغ، واستراتيجيات إجراء الاختبارات، اعتمادًا على وجود فاشية كوليرا محتملة أو مؤكدة من عدمه يجب التأكد من أن جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية بالترصد (مثل: العاملين في المرافق الصحية، والعاملين الصحيين المجتمعيين، والمختبرات):

- تعرف نوعية البيانات التي ينبغي الإبلاغ عنها، وطرق الإبلاغ، وتوقيته، والحالات التي يجب اختبارها وكيفية اختبارها
- لديها الأدوات والإمدادات والمهارات التي تحتاج إليها
- تجري ترصد الكوليرا والاختبارات وفقًا للاستراتيجيات المعمول بها (أي تتابع وترصد مؤشرات أداء الترصد)

التأكد من اكتشاف حالات الكوليرا والإبلاغ عنها واختبارها كما ينبغي

• ماهو الوضع الراهن للكوليرا؟

تجميع وتنقية وتحليل البيانات المُبلِّغ عنها من خلال نظام الترصد القائم على المرافق الصحية والترصد المجتمعي والمختبرات، إضافة إلى الإشارات التي يكشف عنها الترصد القائم على الأحداث:

- يوميًا للكشف سريعًا عن فاشية كوليرا (مشتببه فيها أو محتملة أو مؤكدة)
- أسبوعيًا لمتابعة /رصد وتفسير ديناميات فاشيات الكوليرا (الوقت والمكان والشخص؛ والمرضاة والوفيات)

تحليل البيانات الوبائية ونتائج الاختبارات

• هل توجد حاجة إلى مزيد من المعلومات لفهم الوضع؟

جمع معلومات إضافية عند الضرورة لتقدير وضع الكوليرا وفهمه على نحو أفضل

- التحقق: الاتصال بالمصدر (المصادر) للتحقق من صحة المعلومات
- تقصي الحالات: إجراء مقابلات مع الحالات لجمع معلومات إضافية عن منشأ العدوى، وعوامل الخطورة، ومصادر التعرض المحتملة، والروابط الوبائية بين الحالات
- التحري الميداني: إجراء تقييم في المواقع وضمّه إلى تدابير الاستجابة الفورية

جمع معلومات إضافية لتقدير الوضع على نحو أفضل

• ماهي الجهات التي ينبغي تعميم/نشر المعلومات عليها وكيفية ذلك؟

- إعداد معلومات محدّثة عن الوضع الراهن للكوليرا
- تعميمها على مختلف القطاعات
- التأكد من استخدامها في التوجيه المستمر للاستجابة

تعميم المعلومات





الكشف عن فاشيات الكوليرا ورصدها

الدور المحوري للسلطات الصحية

• ماهي الحالات التي يجب الإبلاغ عنها؟

في حالة وجود فاشية كوليرا محتملة أو مؤكدة

الحالة المشتبه في إصابتها بالكوليرا هي أي شخص يعاني من الإسهال المائي الحاد أو توفي بسببه

جميع الحالات المشتبه فيها يُبلّغ عنها على الأقل أسبوعيًا

في حالة عدم وجود فاشية كوليرا محتملة أو مؤكدة

الحالة المشتبه في إصابتها بالكوليرا هي شخص يبلغ من العمر عامين أو أكثر:

- يعاني من الإسهال المائي الحاد والجفاف الشديد أو

- توفي بسبب الإسهال المائي الحاد

جميع الحالات المشتبه فيها يُبلّغ عنها في غضون 24 ساعة

• من يجب أن يخضع للاختبارات؟

في حالة وجود فاشية كوليرا محتملة أو مؤكدة

تجرى الاختبارات على جزء من الحالات المشتبه

في حالة عدم وجود فاشية كوليرا محتملة أو مؤكدة

تُجرى الاختبارات على جميع الحالات المشتبه فيها

- ينبغي ألا يتسبب أخذ العينات في تأخير الإماهة (التزويد بالسوائل)
- يمكن استخدام الاختبارات التشخيصية السريعة لاستبعاد الإصابة بالكوليرا، ولكن لا يمكن استخدامها لتأكيد حالات الكوليرا الفردية.
- في حالة توفر الاختبارات التشخيصية السريعة، فإنها تُستخدم لفرز العينات الإيجابية في الاختبار التشخيصي السريع من أجل التأكيد المختبري.
- يتحقق التأكيد المختبري عن طريق اختبار تفاعل البوليمراز التسلسلي و/ أو المزرعة

• كيف توصّف وضع الكوليرا؟

الاستجابة	التعريف	فاشية الكوليرا المشتبه فيها
إجراءات الصحة العامة الفورية بشأن أمراض الإسهال الحاد دون انتظار التأكيد المختبري	الإبلاغ عن حالتين أو أكثر مشتبه في إصابتها بالكوليرا في وحدة الترضد في غضون 7 أيام أو الإبلاغ عن حالة واحدة مشتبه في إصابتها بالكوليرا جاءت نتيجة إيجابية في الاختبار التشخيصي السريع	فاشية الكوليرا المشتبه فيها
الاستجابة السريعة والشاملة والمتعددة القطاعات لفاشية الكوليرا دون انتظار التأكيد المختبري	بلوغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا ذات النتائج الإيجابية في الاختبار التشخيصي السريع في وحدة الترضد خلال الأربعة عشر يوماً السابقة عتبة معينة أو تجاوزها	فاشية الكوليرا المحتملة
الاستجابة السريعة والشاملة والمتعددة القطاعات لفاشية الكوليرا	عدد الحالات الإيجابية في الاختبار التشخيصي السريع الخاضعة للاختبار	فاشية الكوليرا المؤكدة
	7-3	3 حالات أو أكثر ذات نتيجة إيجابية
	10-8	4 حالات أو أكثر ذات نتيجة إيجابية
	14-11	5 حالات أو أكثر ذات نتيجة إيجابية
	17-15	6 حالات أو أكثر ذات نتيجة إيجابية
	21-18	7 حالات أو أكثر ذات نتيجة إيجابية
	تأكيد حالة إصابة بالكوليرا مكتسبة محليًا واحدة على الأقل	نهاية فاشية الكوليرا المحتملة أو المؤكدة
	لمدة 4 أسابيع متوالية على الأقل، تأتي نتائج اختبار جميع الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا سلبية في الاختبار التشخيصي السريع أو المزرعة أو تفاعل البوليمراز التسلسلي.	

